



**Infórmate y ten
confianza**



Guía de Terapia Intracavernosa

(857) 233-5837 | www.menMD.com

Instrucciones

Introducción

La mayoría de los pacientes con disfunción eréctil (DE) pueden ser potencialmente tratados con terapia intracavernosa.

- El inicio de la erección suele empezar 10 minutos después de la inyección intracavernosa.

- La duración varía entre 30 minutos a dos horas.

Objetivo terapéutico: una erección suficientemente rígida para la penetración con una duración entre 30 minutos y una hora.

I. Preparación de la inyectoradora

(Ver foto de abajo)


Limpie el tapón de goma del frasco de mezcla intracavernosa con una toallita de alcohol.

Inserte la aguja en el centro del tapón de goma y voltee la botella e inyectoradora boca abajo asegurándose de que la aguja este cubierta con mezcla intracavernosa y que usted pueda leer los números de la inyectoradora.

Tire del émbolo hacia abajo más allá de la dosis prescrita y reinyecte el medicamento en la botella. Esta maniobra elimina cualquier burbuja de aire contenida en la inyectoradora.

Tire del émbolo hacia abajo más allá de la dosis que se les prescribió una vez más y esta vez empuje lentamente el émbolo hasta la dosis prescrita.

Paso I. Preparación de la inyectoradora



Retire la inyectoradora de la botella y colóquela sobre una superficie limpia asegurándose de que la aguja no toque algo.




Para ver un video educativo sobre la terapia intracavernosa visite la página de internet: www.menmd.com/injection-therapy-animation/

II. Intracavernosal Injection

Sujete el pene por el glande y estírelo suavemente de manera que este derecho. Con una toallita de alcohol, limpie la zona media del pene e inyecte la dosis recomendada a las diez y media o la una y treinta con un ángulo de 90 grados.


Figura 1: Sección transversal del pene



Retire la aguja cuidadosamente evitando que se doble.

Aplique presión en el lugar de inyección durante 3-5 minutos para minimizar sangramiento y trauma peniano sobretodo si toma anticoagulantes como warfarina. Descarte la inyectoradora de manera segura.

Paso II. Inyección intracavernosa



MenMD

Contacte a MenMD en caso de que tenga alguna pregunta o duda relacionada con la terapia intracavernosa.

Teléfono: (857) 233-5837

Servicios provistos por MenMD

Como paciente de un médico miembro de MenMD, tiene acceso a coordinadores de atención al paciente dedicados a ayudarle con la terapia intracavernosa. El coordinador de atención al paciente trabaja estrechamente con su médico para ajustar la dosis o mezcla intracavernosa con el objeto de maximizar los resultados del tratamiento. El coordinador de atención al paciente también hablará con usted sobre cómo reordenar el medicamento para asegurarse de que siempre tenga un suministro estéril, fresco y potente. En nuestra experiencia, los pacientes con los mejores resultados son los que trabajan estrechamente con nosotros. MenMD y su médico deben ser su contacto principal en caso de cualquier pregunta o inquietud relacionadas con su medicamento.

Recordatorios importantes

Las mezclas intracavernosas deben mantenerse refrigeradas ya que algunos de los componentes son sensibles a la temperatura.

La terapia intracavernosa sólo puede utilizarse una vez en un período de 24 horas y no más de tres veces a la semana a menos que su médico lo prescriba de otra forma. No exceda la dosis prescrita, sobredosis pueden provocar erecciones dolorosas y prolongadas conocidas como priapismo. Las erecciones prolongadas pueden causar daño permanente y disfunción eréctil irreversible. Si usted experimenta una erección prolongada consulte a su médico urgentemente o diríjase a la sala de emergencias más cercana. La combinación de inyecciones intracavernosas con agentes erectogénicos como Viagra, Levitra, Staxyn, o Cialis está contraindicado. Si usted experimenta dolor persistente, inflamación o fiebre, es posible que tenga una infección. Por favor, póngase en contacto inmediatamente con su médico.



Contacte a MenMD en caso de que tenga alguna pregunta o duda relacionada con la terapia intracavernosa.

Se puede comunicar con nosotros por teléfono **(857) 233-5837** o por correo electrónico **expert@menMD.com**

Para obtener más información, visite nuestra página de internet:

www.menMD.com

Fax: (857) 350-4599